

โรคหรืออาการสำคัญ ของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น :



ผู้รับจ้างฉีดสารเคมีทางการเกษตร



เกษตรกรเพาะปลูกพืช



งานผลิตสารกำจัดศัตรูพืช

ปัจจัยเสี่ยง



ความรุนแรงของพิษ
ตามประเภทของสาร
กำจัดศัตรูพืช

พฤติกรรมเสี่ยง



ไม่สวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล



ไม่ชำระล้างร่างกาย
หลังปฏิบัติงาน



อาการแสดงของโรค



ผื่นแดง แสบร้อน
ที่ผิวหนัง



แสบคอ แสบจมูก
ปวดศีรษะ มึน เหนื่อย

วิธีการป้องกันตนเอง



อ่านวิธีใช้
บนฉลาก
ทุกครั้ง



ล้างหน้า
หลังทำงาน
ถอดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันที



สวมใส่ถุงมือ
สิ่งจำปิดมิดชิด
และรองเท้าบูตขณะทำงาน



แยกทิ้งขยะ
หรือบรรจุภัณฑ์
ให้ถูกวิธี

***หากมีความผิดปกติหลังสัมผัสพิษควรรีบไปพบแพทย์



6 โรค จากการประกอบอาชีพ

หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ

*มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



โรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่ว หรือสารประกอบของตะกั่ว



โรคหรืออาการที่เกิดจากฝุ่นซิลิกา



โรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะอุณหภูมิ



โรคหรืออาการที่เกิดจากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) หรือโรคเมร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน)



โรคหรืออาการที่เกิดจากพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช



โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือจากรังสีชนิดก่อไอออน

โรคจากฝุ่นซิลิกา

กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น



ผลิตกระเบื้องเซรามิก



แกะสลักหิน



โรงไม้หิน

ปัจจัยเสี่ยง



ฝุ่นซิลิกาในบรรยากาศ
การทำงาน
เกินค่ามาตรฐาน



การขาดมาตรการ
ป้องกันที่ดี

พฤติกรรมเสี่ยง



ไม่สวมหน้ากาก
ป้องกันฝุ่นซิลิกา ขณะทำงาน



การสูบบุหรี่ อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของโรค



อาการแสดงของโรค



ไอเรื้อรัง
มีเสมหะ



หอบเหนื่อยง่าย
เมื่อออกกำลังกาย

วิธีการป้องกันตนเอง



สวมใส่ PPE
เมื่อต้องทำงาน
สัมผัสฝุ่นซิลิกา



ทำความสะอาด
ร่างกาย
หลังปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง



ตรวจ
สมรรถภาพปอด
ทุก 1 ปี