

แนวทางป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำว่าหากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลีย  
บาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่  
ทันทีหลายๆครั้ง นานประมาณ ๑๐ นาที และใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการ  
ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรับ  
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากฉีดวัคซีนแล้วควรไปตามนัดทุกครั้ง  
นอกจากนี้ ควรสังเกตสุนัขว่ามีอาการผิดปกติหรือตายใน ๑๐ วันหรือไม่  
ภายหลังสุนัขตัวนั้นไปกัดข่วนคน ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข  
บ้า ทั้งนี้ ขอให้ยึดหลัก “คาถา ๕ ย.” เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรค  
พิษสุนัขบ้า ดังนี้ ๑.อย่าแหย่ ให้สัตว์โมโหเพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้  
๒.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์ ๓.อย่าแยก สัตว์ที่กำลัง  
กัดกันด้วยมือเปล่า ๔.อย่าหยิบ จานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกิน  
และ ๕.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรค  
พิษสุนัขบ้า และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี สามารถลงทะเบียนขอรับบริการ  
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่ อสม.ในเขตพื้นที่ของท่านหรือที่กอง  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น๓) สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  
หรือโทร ๐๗๕-๘๐๙๕๗๗ ต่อ ๔